

GANADERÍA DE LA CARNE

4° AÑO

Actividades de la semana del 4 al 8 de mayo

Tema: Características de la actividad ganadera . Razas de bovinos

Hola! En los textos que mando con este trabajo vas a encontrar algunos datos que ya vimos en trabajos anteriores y , también, alguna información nueva. La idea es que al leerlos y contestar las preguntas aclares las dudas que pudieron quedar e incorpores información nueva al tema. Te pido que leas, realices las actividades y me lo envíes.

En el primer párrafo dice “para la venta a invernaderos”... pero no se refiere con la palabra invernadero a la estructura con techo de polietileno en la que cultivamos florales. Con la palabra invernadero se refiere a la etapa de la ganadería llamada **invernada**. Luego, nombra los “establecimientos de cría e invernada”.

Actividad 1: Investigá y explicá brevemente qué es la cría y qué es la invernada en ganadería. ¿En qué zonas de nuestro país se realiza cría y en cuál, invernada?

Actividad 2: Leé el texto sobre razas y respondé:

- a. ¿Qué diferencia hay entre las razas británicas, continentales e Indicas?
- b. ¿Cuál de los grupos de razas nombradas en el punto anterior criarías en el norte argentino? (relacionalo con el mapa de zonas ganaderas que ya hiciste y las características de cada zona)
- c. ¿Cuáles son la primera y segunda raza más criadas en la cuenca del Salado (región Pampeana)? ¿Cuáles son las características de estas dos razas?
- d. ¿A qué se le llama “Razas o derivados sintéticos”? ¿Cuáles son?
- e. Investigá y explicá qué significa “entore precoz”

2. GANADERÍA DE CARNE

Introducción

La cría bovina es la rama de la ganadería cuyo objetivo es la producción de terneros para la venta a invernaderos. Es de aclarar que en los establecimientos mixtos de cría e invernada se desarrolla el ciclo completo hasta la terminación del animal para el consumo.

Es vital en esta actividad el cuidado que el productor brinde a todos los animales que participan en la producción. Por un lado, tendrá a los animales utilizados para el rodeo, tanto machos y hembras, y luego, ya en el periodo de gestación, a la vaca servida.

Las zonas dedicadas a la cría bovina se caracterizan por ser una llanura muy plana, de escasa pendiente, con desagües dificultosos y suelos muy variados. Son grandes extensiones de tierra, con limitaciones del suelo para la agricultura.

Razas

Clasificación por origen:

- *Británicas: razas para leche y carne (con más grasa para consumo)*



HEREFORD: cara y zona de pecho y vientre blanca, al igual que los extremos de miembros y punta de cola; el resto colorado. Mochos o con cuernos, raza maternal. Es la segunda raza en la Cuenca del Salado, también en Corrientes, y en toda la Patagonia (se adaptan muy bien a climas extremos).

CARETA: colorada o negra con la cara blanca y fácil de engordar (400-420kg). Ternero más pesado al destete, por eso es la craza más difundida en todo el país. Muy numerosas en la Cuenca del Salado. Madres más fértiles.

SHORTON: fue la primera raza que se trajo al país, aunque casi no quedan. Color colorado cereza, blanco o rosillo (mezcla de colores). Raza maternal. Muy precoz. Facilidad de engorde; mocho o con cuernos.

CONTINENTALES

CHAROLAIS, LIMOUSIN, SIMMENTAL: Si bien son razas reconocidas como carniceras, tienen muy poco desarrollo en el país. Hemos omitido su descripción en este resumen, pero podés buscar datos en distintas fuentes.

ÍNDICAS: No incluimos descripción

NELORE: No incluimos descripción

BRAHMAN: Blancas, grisáceas o coloradas, más



- *Continental: razas para leche y carne (muchísima masa muscular y poca cantidad de grasa)*
- *Índicas: son animales muy adaptados a climas tropicales (calor, garrapatas y pastos de mala calidad)*
- *Nelore: (índicas)*
- *Brahman: criada en USA*
- *Derivados sintéticos:*

Brahman x Shorton: Santa Gertrudis

Brahman x Angus: Brangus

Brahman x Hereford: Braford

Angus negra x Hereford rojo: Careta

Características

BRITÁNICAS

ANGUS: la más numerosa del país, puede ser negra o colorada, 100 % maternal (mayor cantidad de terneros y facilidad de parto). Mayor cantidad en la Cuenca del Salado. Bajos requerimientos, mayor adaptación, mocho. Tamaño chico. Facilidad de engorde en sistemas pastoriles y buena calidad de carne. Precoz. Se puede tener alta cantidad de animales por hectárea.

HEREFORD: cara y zona de pecho y vientre blanca, al igual que los extremos de miembros y punta de cola; el resto colorado. Mochos o con cuernos, raza maternal.

BRAHMAN: Blancas, grisáceas o coloradas, más oscuras en la jiba y cuello. Orejas largas, grandes y caídas. Prepucio muy desarrollado y caído. Con o sin cuernos. Raza paterna (alta ganancia diaria de peso, conformación carnicera, provee toros padres y no tiene facilidad de partos). Se usan mucho para producir Bradford en el noroeste argentino.

SINTÉTICAS

BRANGUS: Raza maternal por excelencia en el NEA. Colorada o negra, se adapta al calor. Mayor ganancia diaria de peso, pero menor facilidad de engrosamiento.

BRAFORD: raza maternal, con o sin cuernos. El cuerpo es colorado con la cara blanca y se adaptan al calor. Se ubican en el NEA y es la segunda más numerosa en dicha región.

CRIOLLA: Más lechera que carnicera, puede haber de varios colores. Largas y angostas. Muy fértil y con mucha facilidad de partos. Se usan para entore precoz. Muy difundida en el NOA y en la Patagonia.

Zonas de cría bovina: *Son aquellas que, por el tipo de suelo o por su clima, permiten contar con pastos de buena calidad y en cantidad suficiente durante todo el año.*

En la Argentina se pueden ubicar grandes zonas

